

ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะเด็กอายุ 3-5 ปี ประจำปี 2566-2568

ศูนย์อนามัย	จังหวัด	ค่าไอโอดีนในปัสสาวะ (µg/L)	จำนวนตัวอย่าง
1	เชียงราย	152.1	150 คน
	พะเยา	176.4	147 คน
	เชียงใหม่	243.0	129 คน
	น่าน	137.9	148 คน
	แม่ฮ่องสอน	268.8	140 คน
	ลำปาง	240.5	150 คน
	แพร่	225.6	150 คน
	ลำพูน	245.6	150 คน
	รวมศูนย์อนามัยที่ 1	N	1,164 คน
		Median	212.0 µg/L
		Q1	135.6 µg/L
		Q3	326.3 µg/L
		Min-Max	14.7-765.5 µg/L
2	อุดรดิตถ์	235.0	149 คน
	สุโขทัย	226.0	149 คน
	พิษณุโลก	286.3	153 คน
	ตาก	236.0	149 คน
	เพชรบูรณ์	235.0	154 คน
	รวมศูนย์อนามัยที่ 2	N	754 คน
		Median	243.0 µg/L
		Q1	166.0 µg/L
		Q3	326.0 µg/L
		Min-Max	17.0-510.0 µg/L

ศูนย์อนามัย	จังหวัด	ค่าไอโอดีนในปัสสาวะ (µg/L)	จำนวนตัวอย่าง
3	กำแพงเพชร	195.4	150 คน
	ชัยนาท	183.3	150 คน
	นครสวรรค์	211.0	150 คน
	พิจิตร	216.1	150 คน
	อุทัยธานี	158.3	150 คน
	รวมศูนย์อนามัยที่ 3	N	750 คน
		Median	192.8 µg/L
		Q1	146.9 µg/L
		Q3	270.6 µg/L
		Min-Max	63.5-568.1 µg/L
4	ปทุมธานี	183.2	140 คน
	นนทบุรี	238.9	146 คน
	นครนายก	196.0	151 คน
	พระนครศรีอยุธยา	186.9	152 คน
	ลพบุรี	234.1	145 คน
	สระบุรี	244.8	144 คน
	สิงห์บุรี	209.1	151 คน
	อ่างทอง	244.4	151 คน
	รวมศูนย์อนามัยที่ 4	N	1,180 คน
		Median	217.95 µg/L
		Q1	141.375 µg/L
		Q3	315.025 µg/L
		Min-Max	10.4-994.6 µg/L
5	กาญจนบุรี	238.9	150 คน
	นครปฐม	255.1	145 คน

ศูนย์อนามัย	จังหวัด	ค่าไอโอดีนในปัสสาวะ (µg/L)	จำนวนตัวอย่าง
	ประจวบคีรีขันธ์	265.9	163 คน
	เพชรบุรี	228.6	149 คน
	ราชบุรี	209.4	103 คน
	สมุทรสงคราม	219.3	142 คน
	สมุทรสาคร	235.0	148 คน
	สุพรรณบุรี	232.2	148 คน
	รวมศูนย์อนามัยที่ 5	N	1,148 คน
		Median	235.9 µg/L
		Q1	154.6 µg/L
		Q3	329.0 µg/L
		Min-Max	12.4-933.7 µg/L
6	จันทบุรี	267.9	150 คน
	ฉะเชิงเทรา	215.1	151 คน
	ชลบุรี	217.4	149 คน
	ตราด	229.3	145 คน
	ปราจีนบุรี	195.5	150 คน
	ระยอง	226.3	155 คน
	สมุทรปราการ	214.8	150 คน
	สระแก้ว	155.1	150 คน
	รวมศูนย์อนามัยที่ 6	N	1,200 คน
		Median	216.4 µg/L
		Q1	170.5 µg/L
		Q3	289.5 µg/L
		Min-Max	16.4-619.9 µg/L
7	กาฬสินธุ์	313.8	149 คน

ศูนย์อนามัย	จังหวัด	ค่าไอโอดีนในปัสสาวะ (µg/L)	จำนวนตัวอย่าง
	ขอนแก่น	257.8	114 คน
	มหาสารคาม	260.3	134 คน
	ร้อยเอ็ด	227.1	150 คน
	รวมศูนย์อนามัยที่ 7	N	547 คน
		Median	266.0 µg/L
		Q1	164.5 µg/L
		Q3	394.4 µg/L
		Min-Max	19.1-518.1 µg/L
8	อุดรธานี	204.4	141 คน
	นครพนม	191.6	141 คน
	บึงกาฬ	160.9	149 คน
	เลย	144.6	150 คน
	สกลนคร	193.7	141 คน
	หนองคาย	178.5	142 คน
	หนองบัวลำภู	176.5	150 คน
	รวมศูนย์อนามัยที่ 8	N	1,014 คน
		Median	175.4 µg/L
		Q1	111.2 µg/L
		Q3	260.8 µg/L
		Min-Max	11.7-935.8 µg/L
9	ชัยภูมิ	237.8	152 คน
	นครราชสีมา	271.9	145 คน
	บุรีรัมย์	201.2	107 คน
	สุรินทร์	388.7	113 คน

ศูนย์อนามัย	จังหวัด	ค่าไอโอดีนในปัสสาวะ (µg/L)	จำนวนตัวอย่าง
	รวมศูนย์อนามัยที่ 9	N	517 คน
		Median	271.3 µg/L
		Q1	174.1 µg/L
		Q3	374.5 µg/L
		Min-Max	13.8-989.7 µg/L
10	มุกดาหาร	135.9	150 คน
	ยโสธร	173.1	150 คน
	ศรีสะเกษ	147.9	150 คน
	อุบลราชธานี	206.0	150 คน
	อำนาจเจริญ	167.3	150 คน
	รวมศูนย์อนามัยที่ 10	N	750 คน
		Median	166.6 µg/L
		Q1	127.5 µg/L
		Q3	217.3 µg/L
		Min-Max	28.7-477.2 µg/L
11	กระบี่	269.2	150 คน
	ชุมพร	208.6	146 คน
	นครศรีธรรมราช	215.6	149 คน
	พังงา	219.5	145 คน
	ระนอง	235.0	150 คน
	สุราษฎร์ธานี	229.2	143 คน
	ภูเก็ต	213.5	150 คน
	รวมศูนย์อนามัยที่ 11	N	1033 คน
		Median	223.1 µg/L
		Q1	174.4 µg/L

ศูนย์อนามัย	จังหวัด	ค่าไอโอดีนในปัสสาวะ (µg/L)	จำนวนตัวอย่าง	
		Q3	310.8	µg/L
		Min-Max	37.7-743.6	µg/L
12	ตรัง	236.1	148	คน
	นราธิวาส	198.8	148	คน
	ปัตตานี	210.1	148	คน
	พัทลุง	245.3	141	คน
	ยะลา	238.8	137	คน
	สงขลา	226.8	149	คน
	สตูล	197.4	148	คน
	รวมศูนย์อนามัยที่ 12	N	1,019	คน
		Median	220.2	µg/L
		Q1	147.9	µg/L
		Q3	303.8	µg/L
		Min-Max	20.4-982.4	µg/L
สสม.	กทม.	222.0	153	คน
รวมทั้งประเทศ	N	11,229 คน		
	Median	214.4 µg/L		
	Q1	149.1 µg/L		
	Q3	305.7 µg/L		
	Min-Max	10.4-994.6 µg/L		

ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 สำนักโภชนาการ