

ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะผู้สูงอายุรายจังหวัด ประจำปี 2566-2568

ศูนย์อนามัย	จังหวัด	ค่าไอโอดีนในปัสสาวะ (µg/L)	จำนวนตัวอย่าง
1	เชียงราย	184.3	150 คน
	พะเยา	186.6	150 คน
	เชียงใหม่	119.9	135 คน
	น่าน	146.0	150 คน
	แม่ฮ่องสอน	116.1	140 คน
	ลำปาง	90.1	150 คน
	แพร่	106.9	150 คน
	ลำพูน	121.0	150 คน
	รวมศูนย์อนามัยที่ 1	N	1,175 คน
		Median	136.0 µg/L
		Q1	85.2 µg/L
		Q3	190.8 µg/L
		Min-Max	12.6-812.5 µg/L
2	อุดรดิตถ์	89.0	149 คน
	สุโขทัย	97.0	152 คน
	พิษณุโลก	122.4	153 คน
	ตาก	71.0	145 คน
	เพชรบูรณ์	67.0	150 คน
	รวมศูนย์อนามัยที่ 2	N	749 คน
		Median	87.0 µg/L
		Q1	48.0 µg/L
		Q3	146.0 µg/L
		Min-Max	10.0-490.0 µg/L

ศูนย์อนามัย	จังหวัด	ค่าไอโอดีนในปัสสาวะ (µg/L)	จำนวนตัวอย่าง
3	กำแพงเพชร	195.4	150 คน
	ชัยนาท	111.7	150 คน
	นครสวรรค์	111.4	150 คน
	พิจิตร	105.4	150 คน
	อุทัยธานี	92.5	140 คน
	รวมศูนย์อนามัยที่ 3	N	740 คน
		Median	112.8 µg/L
		Q1	89.3 µg/L
		Q3	150.9 µg/L
		Min-Max	30.4-568.1 µg/L
4	ปทุมธานี	89.9	137 คน
	นนทบุรี	105.2	154 คน
	นครนายก	102.8	156 คน
	พระนครศรีอยุธยา	109.5	146 คน
	ลพบุรี	109.4	148 คน
	สระบุรี	109.7	149 คน
	สิงห์บุรี	132.6	153 คน
	อ่างทอง	116.6	149 คน
	รวมศูนย์อนามัยที่ 4	N	1,192 คน
		Median	109.6 µg/L
		Q1	72.8 µg/L
		Q3	176.7 µg/L
		Min-Max	10.4-886.7 µg/L
	กาญจนบุรี	101.9	148 คน
	นครปฐม	102.8	149 คน

ศูนย์อนามัย	จังหวัด	ค่าไอโอดีนในปัสสาวะ (µg/L)	จำนวนตัวอย่าง
5	ประจวบคีรีขันธ์	128.5	149 คน
	เพชรบุรี	98.0	145 คน
	ราชบุรี	128.0	104 คน
	สมุทรสงคราม	103.9	149 คน
	สมุทรสาคร	98.7	150 คน
	สุพรรณบุรี	94.3	148 คน
	รวมศูนย์อนามัยที่ 5	N	1,142 คน
		Median	105.0 µg/L
		Q1	66.9 µg/L
		Q3	163.2 µg/L
		Min-Max	10.1-892.8 µg/L
6	จันทบุรี	196.6	150 คน
	ฉะเชิงเทรา	129.5	150 คน
	ชลบุรี	174.3	150 คน
	ตราด	130.5	145 คน
	ปราจีนบุรี	126.3	149 คน
	ระยอง	130.2	155 คน
	สมุทรปราการ	142.7	150 คน
	สระแก้ว	106.7	150 คน
	รวมศูนย์อนามัยที่ 6	N	1,199 คน
		Median	140.5 µg/L
		Q1	103.2 µg/L
		Q3	184.3 µg/L
		Min-Max	19.7-775.9 µg/L
7	กาฬสินธุ์	81.3	144 คน

ศูนย์อนามัย	จังหวัด	ค่าไอโอดีนในปัสสาวะ (µg/L)	จำนวนตัวอย่าง
	ขอนแก่น	81.3	135 คน
	มหาสารคาม	87.7	129 คน
	ร้อยเอ็ด	79.7	142 คน
	รวมศูนย์อนามัยที่ 7	N	550 คน
		Median	81.5 µg/L
		Q1	47.6 µg/L
		Q3	124.9 µg/L
		Min-Max	10.5-497.4 µg/L
8	อุดรธานี	90.6	147 คน
	นครพนม	96.2	146 คน
	บึงกาฬ	52.1	143 คน
	เลย	62.7	147 คน
	สกลนคร	104.1	122 คน
	หนองคาย	77.9	141 คน
	หนองบัวลำภู	58.2	143 คน
	รวมศูนย์อนามัยที่ 8	N	989 คน
		Median	71.0 µg/L
		Q1	42.6 µg/L
		Q3	121.2 µg/L
		Min-Max	10.0-960.8 µg/L
9	ชัยภูมิ	87.2	155 คน
	นครราชสีมา	107.7	149 คน
	บุรีรัมย์	140.9	147 คน
	สุรินทร์	186.6	146 คน
	รวมศูนย์อนามัยที่ 9	N	597 คน

ศูนย์อนามัย	จังหวัด	ค่าไอโอดีนในปัสสาวะ (µg/L)	จำนวนตัวอย่าง	
		Median	125.0	µg/L
		Q1	77.2	µg/L
		Q3	200.6	µg/L
		Min-Max	17.4-979.2	µg/L
10	มุกดาหาร	146.5	150	คน
	ยโสธร	207.8	150	คน
	ศรีสะเกษ	74.0	149	คน
	อุบลราชธานี	205.6	149	คน
	อำนาจเจริญ	82.5	162	คน
	รวมศูนย์อนามัยที่ 10	N	760	คน
		Median	138.1	µg/L
		Q1	86.6	µg/L
		Q3	208.1	µg/L
		Min-Max	14.4-547.4	µg/L
11	กระเป๋	156.3	151	คน
	ชุมพร	126.1	151	คน
	นครศรีธรรมราช	139.7	150	คน
	พังงา	174.8	145	คน
	ระนอง	152.1	150	คน
	สุราษฎร์ธานี	148.6	148	คน
	ภูเก็ต	149.9	150	คน
	รวมศูนย์อนามัยที่ 11	N	1,045	คน
		Median	148.6	µg/L
		Q1	108.9	µg/L
		Q3	200.2	µg/L

ศูนย์อนามัย	จังหวัด	ค่าไอโอดีนในปัสสาวะ (µg/L)	จำนวนตัวอย่าง	
		Min-Max	11.7-718.6	µg/L
12	ตรัง	117.4	152	คน
	นราธิวาส	104.0	149	คน
	ปัตตานี	97.9	155	คน
	พัทลุง	132.0	153	คน
	ยะลา	115.2	148	คน
	สงขลา	127.7	150	คน
	สตูล	162.9	149	คน
	รวมศูนย์อนามัยที่ 12	N	1,056	คน
		Median	122.3	µg/L
		Q1	76.45	µg/L
		Q3	180.025	µg/L
		Min-Max	13.9-940.2	µg/L
สสม.	กทม.	136.0	151	คน
รวมทั้งประเทศ	N	11,345 คน		
	Median	117.2 µg/L		
	Q1	74.0 µg/L		
	Q3	176.2 µg/L		
	Min-Max	10.0-979.2 µg/L		

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2569 สำนักโภชนาการ