

การเฝ้าระวังระดับไอโอดีนในปีสภาวะหญิงตั้งครรภ์

หญิงตั้งครรภ์

เขียว ติดกัน 3 ปี เก็บข้อมูลทุก 3 ปี
จังหวัดละ 300 ให้หารด้วยจำนวนอำเภอ
จะได้เป็นจำนวนที่เก็บต่ออำเภอ

แดง 3 ปี ติดกับ เก็บข้อมูลทุกปี
จังหวัดละ 300 ให้หารด้วยจำนวนอำเภอ
จะได้เป็นจำนวนที่เก็บต่ออำเภอ

พื้นที่สีแดงขาดสารไอโอดีน 27 จังหวัด



จังหวัดที่ต้องเก็บข้อมูล

ศูนย์อนามัยที่			จังหวัด	
1,3,6,9,10,11 และ สสม.			ไม่มีจังหวัดที่ต้องเก็บข้อมูล	
2	เพชรบูรณ์	พิษณุโลก		
4	นครนายก นนทบุรี อยุธยา	ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง		
5	สมุทรสาคร สุพรรณบุรี กาญจนบุรี	ราชบุรี สมุทรสงคราม นครปฐม		
7	กาฬสินธุ์ ขอนแก่น	ร้อยเอ็ด		
8	นครพนม บึงกาฬ เลย หนองคาย	หนองบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร		
12	ตรัง ยะลา	พัทลุง		


การเฝ้าระวังระดับไอโอดีนในปีสสาวะผู้สูงอายุ



ผู้สูงอายุ

เขียว เก็บข้อมูลทุก 3 ปี
แดง เก็บข้อมูลทุก 2 ปี
จังหวัดละ 150 ลองคำนวณเทียบกับ
ข้อมูลล่าสุด cluster survey

พื้นที่ขาดสารไอโอดีน 24 จังหวัด เกิน 2 จังหวัด



จังหวัดที่ต้องเก็บข้อมูล

ศูนย์อนามัยที่		จังหวัด
6,11 และ สสม.	ไม่มีจังหวัดที่ต้องเก็บข้อมูล	
1	ลำปาง	
2	ตาก เพชรบูรณ์	สุโขทัย อุตรดิตถ์
3	อุทัยธานี	
4	ปทุมธานี	
5	เพชรบุรี สมุทรสาคร สุพรรณบุรี	
7	กาฬสินธุ์ ขอนแก่น	มหาสารคาม ร้อยเอ็ด
8	นครพนม บึงกาฬ เลย	หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี
9	ชัยภูมิ	
10	ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ	ยโสธร อุบลราชธานี
12	ปัตตานี	

การเฝ้าระวังระดับไอโอดีนในปัสสาวะเด็ก 3 - 5 ปี



เด็ก 3 - 5 ปี

เก็บตัวอย่างน้ำปัสสาวะจังหวัดสุรินทร์ 3 ปีก่อน
เขียว เก็บข้อมูลทุก 3 ปี
เด็กที่ UI สูง หมู่บ้านไหนบ้าง

เด็ก 3 - 5 ปี ไอโอดีนเกิน 1 จังหวัด

จังหวัดที่ต้องเก็บข้อมูล

ศูนย์อนามัยที่	จังหวัด
1- 8, 10-12, สสม.	ไม่มีจังหวัดที่ต้องเก็บข้อมูล
9	สุรินทร์

